

2025 - 2026 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K - 12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This document is not intended as a substitute for the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)	Minimum Number of Doses Required by Grade Level												Notes		
	Grades K - sixth							Grade seventh		Grades eighth-12th					
	K	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
Diphtheria/Tetanus/ Pertussis(DTaP/DTP/DT/ Td/Tdap)	Five doses or four doses							Three dose primary series and one booster dose of tdap / td within the last five years		Three dose primary series and one booster dose of tdap / td within the last 10 years			For K – sixth grade: five doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; one dose must have been received on or after the fourth birthday. However, four doses meet the requirement if the fourth dose was received on or after the fourth birthday. ¹ For students aged 7 years and older, three doses meet the requirement if one dose was received on or after the fourth birthday. ¹ For seventh grade: one dose of Tdap is required if at least five years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.* For eighth – 12th grade: one dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. **Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.		
Polio	Four doses or three doses												For K-12th grade: four doses of polio; one dose must be received on or after the fourth birthday. ¹ However, three doses meet the requirement if the third dose was received on or after the fourth birthday. ¹ Polio vaccine is not required for persons eighteen years of age or older.		
Measles, Mumps, and Rubella ² (MMR)	Two doses												For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹ Students vaccinated prior to 2009 with two doses of measles and one dose each of rubella and mumps satisfy this requirement		
Hepatitis B ²	Three doses												For students aged 11 – 15 years, two doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax®) was received. Dosage (10 mcg /1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax®) must be clearly documented. If Recombivax® was not the vaccine received, a three dose series is required.		
Varicella ^{2,3}	Two doses												For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹		
Meningococcal (MCV4)								One dose					For seventh – 12th grade, one dose of quadrivalent meningococcal conjugate vaccine is required on or after the student's 11th ¹ birthday.		
Hepatitis A ²	Two doses												For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹		

NOTE: Shaded area indicates that the vaccine is not required for the respective grade.

↓ Notes on the back page, please turn over. ↓

Requisitos mínimos de vacunas en Texas de 2025 -2026 para estudiantes de kínder a 12.o grado

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados al Código Administrativo de Texas (TAC), título 25, Servicios de salud, secciones 97.61 a 97.72. Este documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código de Educación de Texas, capítulo 38, confiere al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad para establecer los requisitos de inmunización.

REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o una escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (Attention a notas y notas de pie de página)	Número mínimo de dosis requeridas por nivel de grado												Notes
	Kínder a sexto grado						Septimo grado	Octavo a 12.o grado					
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)	Cinco dosis o quatro dosis						Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de la vacuna tdap/ td dentro de los últimos cinco años	Una serie primaria de tres dosis y un Refuerzo de la vacuna tdap / td Dentro de los últimos 10 años					Para los grados kínder a sexto: cinco dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina; debe haberse recibido una dosis en o después del cuarto cumpleaños. Sin embargo, con quatro dosis se cubre el requisito si la quarta dosis se recibió en o después del cuarto cumpleaños.¹ Para los estudiantes de 7 años de edad o más, con tres dosis cumplen con el requisito si recibieron una de las dosis en o después del cuarto cumpleaños.¹ Para el septemo grado: Se requiere una dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos 5 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.* Para los grados octavo a 12.o: Se requiere una dosis de la vacuna Tdap cuando hayan pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna que contenga tétanos.* *La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para la vacuna contra la tosferina.
Polio	Quatro dosis o tres dosis												Para los grados kínder a 12.o: quatro dosis de la vacuna contra la polio; debe recibirse una dosis en o después del cuarto cumpleaños.¹ Con tres dosis se cumple con el requisito si la tercera dosis se recibió en o después del 4.o cumpleaños.¹ Gente mayor de 18 años no requieren una dosis de polio
Sarampión, paperas y rubeola ² (MMR)	Dos dosis												Para los grados kínder a 12.o: Se requieren dos dosis de la vacuna, la primera de las cuales debe recibirse en o después del primer cumpleaños.¹ Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con dos dosis contra el sarampión y una dosis contra la rubeola y una dosis contra las paperas cumplen con este requisito.
Hepatitis B ²	Tres dosis												Para los estudiantes de 11 a 15 años de edad, con dos dosis cumplen con el requisito si recibieron la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Tanto la dosis (10 mcg / 1.0 mL) como el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue Recombivax®, se requiere una serie de tres.
Varicella ^{2, 3}	Dos dosis												Para los grados kínder a 12.o: Se requieren 2 dosis, de las cuales la 1.a dosis debe recibirse en o después del 1.er cumpleaños.¹
Vacuna antimeningocócica (MCV4)							Una dosis						Para los grados 7.o a 12.o, se requiere 1 dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada en o después del 11.o cumpleaños del estudiante.
Hepatitis A ²	Dos dosis												Para los g rados kínder a 1 2.o: Son necesarias 2 dosis, la 1a de las cual es debe re cibirse en o después del 1er cumpleaños.¹

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.

↓ Notas al reverso, por favor dé la vuelta.↓